



فلامینگو



Kingdom: Animalia

Phylum: Chordata

Class: Aves

Order: Phoenicopteriformes

Family: Phoenicopteridae

Genus: *Phoenicopterus*

Species: *P. ruber*

Binomial name: *Phoenicopterus ruber*

فلامینگوها در همه قاره ها به جز قطب جنوب و استرالیا یافت می شوند. بسته به مرجع درگیر ، حداکثر شش گونه مجزا وجود دارد که هر کدام دارای محدوده و پراکنندگی جغرافیایی خاص خود هستند. به طور خاص ، محدوده فلامینگوهای بزرگ تر در سراسر خط ساحلی آفریقا ، دریای مدیترانه ، بخش هایی از آسیا و هند و همچنین جنوب ایالات متحده ، کارائیب و شبه جزیره یوکاتان که زیستگاه های گرم ساحلی وجود دارد ، گسترش می یابد.

پرنندگان جوان هنگامی که برای اولین بار از تخم بیرون می آیند با یک پر کوچک پوشانده می شوند. هر دو پاهای آن ها به رنگ خاکستری تیره است و فقط با بالغ شدن پرنده صورتی می شود. پرها نیز در ابتدا خاکستری هستند ، اما با افزایش سن فلامینگو به تدریج پره های صورتی و بالغ جایگزین آن ها می شود و ترکیبات کاروتنوئیدی را از رژیم غذایی خود در رشد جدید ترکیب می کند. به طور کلی بلوغ حدود سه سال به طول می انجامد.

مردان و زنان عموماً تک همسری هستند و در دوران جوجه کشی و پرورش کودکان با هم باقی می مانند. همسرها اغلب سال ها با هم خواهند ماند و تنها پس از مرگ همسر دیگر ، همسر جدیدی را انتخاب می کنند.